

bloemen, terwijl sommige andere soorten geassocieerd zijn met mieren. Heel interessant zijn de soorten die een commensale relatie met spinnen en predatore insecten als Odonata, Reduviidae and Asilidae hebben. Zij liften met hen mee en zuigen vloeistof op van de prooidieren van hun 'gastheren'. Als aanpassing aan dit gedrag hebben deze soorten een proboscis met verlengde labellae.

Milichiinae	♂♂	♀♀	tot.	Vangstperiode
<i>Desmometopa</i> Loew				
<i>m-nigrum</i> (Zetterstedt)	3	1	4	7.vii-25.viii
<i>Phyllomyza</i> Fallén				
<i>securicornis</i> Fallén	1	—	1	9-16.vi

Literatuur

- Hennig, W., 1937. Milichiidae et Carnidae.— In: (E. Lindner ed.) Die Fliegen der paläarktischen Region 6(60a): 1-91.
- Papp, L., 1978. Család: Milichiidae - Pákosztoslegyek.— Fauna Hungariae 133(72): 9-51.
- Papp, L., 1984. Family Milichiidae.— In: (A. Soós & L. Papp eds) Catalogue of Palaearctic Diptera: 110-118.
- Papp, L., 1993. Three new milichiid species from Hungary.— Ann. hist.-nat. Mus. nat. hung. 85: 133-139.

Muscidae (Echte Vliegen) — Th. Zeegers

Muscinae	♂♂	♀♀	tot.	Vangstperiode
<i>Dasyphora</i> Robineau-Desvoidy				
indet.	?	?	1	14-21.vii
<i>Mesembrina</i> Meigen				
<i>meridiana</i> (Linnaeus)	?	?	11	19.v-14.vii
<i>Musca</i> Linnaeus				
<i>autumnalis</i> De Geer	?	?	46	2-23.vi
<i>Polieta</i> Rondani				
<i>lardaria</i> (Fabricius)	?	?	1	2-9.vi
<i>Stomoxys</i> Geoffroy				
<i>calcitrans</i> (Linnaeus)	?	?	1	14-21.vii

Slechts een klein deel van de calytrate vliegen werd tot nu toe tot op familie uitgezocht. Het overgrote deel van de Muscidae moet dan ook nog gedetermineerd worden.

Neottiophilidae — J.W.A. van Zuijlen

De larven leven als ectoparasieten op nestjongen van verschillende vogels, voornamelijk vink- en lijsterachtigen.