

Mas & Fem. Mense Jun. & Jul. passim in Suecia. — Mi-
nuta, Oscine Imata duplo minor & ultra. Caput flavum: vertice
depresso, vix setoso, macula sternalium nigra, opaca? Antennae
pallidae, apice nigra? seta geniculata, brevissima. Thorax dorso
obscurus, lineis duabus longitudinalibus, tenuibus, & parum per-
spicuis, scutelloque flavis. Pectus nigro-maculata. Abdomen dorso
infuscatum, basi & ventre pallidum. Pedes pallidi, femoribus
interdum nigris vel nigro-maculatis. Tarsi extus obscuri. Alae hy-
alinae; nervo auxiliari ad medium costae non extenso, nervis lon-
gitudinalibus 2, 3, 4, subrectis, quarum secundus & tertius ante api-
cem & quartus in summo alae apice, cum nervo costali conjungitur.

Not. Larva in Culmis Secalis, quos destruit, vitam degit, a
Cl. BJERKANDER l. c. descripta. Descriptio autem Imaginis in
Ocin. m. & *livectam* & *Panillionis* emineo quadrat nulla ibidem
facta de situ nervorum in alis commemoratione. Larvas quoque
utriusque speciei in culnis segetum s. graminum habitare verisi-
millimum est. Magnitudo autem unius lineae, quam *Musca pu-
millionis* adscribit Cl. Bjerkander, cum nostra specie emineo con-
venit, Ideoque hujus laudati Naturae Scrutatoris individua, in Act.
Holm. descripta, ad nostram pertinere *Oscinam pumillionis* jure me-
ritoque putamus. Individuum autem, e larva culmi secalis ortum,
quod h. m. BJERKANDER cum Cel. Nostro Prof. AND. LINDBECK
communicavit, a nobis lustratum, totum nigrum, non hujus est
speciei, sed *Oscinis Frit.* Quin igitur Cl. BJERKANDER & larvas pluri-
mum Oscinis specierum, in culnis forsitan cohabitantes, exclusisset
& differentiam unius tantum speciei descripsisset vix dubitamus.
— Ceterum Figuram in Act. Soc. Linn. 2. 78. t. 15. *Muscae pu-
millionis* Bjerk. non vidimus.

12. *O. lineella* nigricans, thorace lineato, capite pedi-
basque flavis.

Mas & Fem. In gramine ad villam Esperöd rarior visa,
a speciebus jam allatis omnino diversa, minutisque individuis *Osci-
nis Frit.* non major. — Thorax subopacus, lineis nigrioribus pictus.
Vertex vix setosus, latus, depressus, flavus. Alae hyalinae: nervis
ut in *O. Frit.* directis. Nervuli tamen transversi magis forsitan ap-
proximati, & ordinarius magis oblique ductus.

MADIZA Clypeus impressus, brevissimus. *Antennae* pro-
pius ad os insertae. *Corpus* ovatum: vertice antror-
sum sensim depresso.

Cor.

Corpus parvum, oblongo-ovatum, depressiusculum, oculis maximis, rotundis; vertice sat distincte setoso, (in prima specie nudo), dilatato, antrorsum sensim depresso. Clypeus igitur brevissimus, emarginatus: ore subporrecto, palpisque exsertis (crassis?) proboscide geniculata, s. hamum acutum formante. Antennæ ut in Oscine, at prope ad os inserta. Pedes nudi. Directio nervorum eadem ferè atque in Oscine; at nervuli transversi magis minusve approximati. — *Metamorphosis* hujus verisimiliter Familie est A glabritie corporis nomen desumimus generis. $\mu\alpha\delta\sigma\lambda\epsilon\upsilon\sigma$ a verbo $\mu\alpha\delta\delta\epsilon\upsilon$.

1. M. lævigata nigra genubus tarsisque pallidis; vertice lævigato.

Fem. In Scania semel visa. — Oscine lineata paullo minor, tota nigra, nitida; genubus tarsisque flavo-albis. Antennæ nigrae, seta geniculata. Oculi tota capitis latera implent. Vertex glaber, triangulum nitidiorem quasi formans: linea utrinque impresso-punctata. Corpus nudum. Vagina feminea angustata, erumpens. Nervi alarum longitudinales recti: horum tertius paullo ante, quartus autem paullo pone summum apicem extenditur. Nervuli transversi similiter distant atque in Oscine lineata.

Mas.

2. M. Oscinina nigra, genubus tarsisque pallidis; vertice pubescente.

Mas & Fem. In Pinu Abiete Ostrogothiæ capta. In parietibus, mense Septembri, rarior. Esperöd. — Præcedenti similis. At antennæ ferrugineæ, & vertex brevissime pilosus; corpus quoque minus nitidum: thorace subpunctulato. Pedes validi, mutici: genubus tarsisque albidis. Directio nervorum in alis eadem & similis atque in præcedente: at nervulus transv. ordinarius magis oblique ductus. Nervulus medius ante medium disci situs.

3. M. glabra nigra nitida, tarsis pallidis; vertice thoraceque setulosus.

Mas & Fem. Hospitatur cum præcedente in parietibus, frequentior, in Scania; flores quoque visitans. In Vestrogothia a D. Dalman lecta. — Statura præcedentis. At color corporis magis nitens, & setæ verticis thoracisque laterales distinctiores & elongatæ. Pedes mutici nigri: tarsis, imprimis posticis albidis. Antennæ autem totæ nigrae. Alæ hyalinæ; nervo auxiliari ad medium costæ non extenso. — Nervi longitudinales recti; quintus marginem alæ

non attingens. Nervulus transversus medius fere in medio disci situs. Anus in altero sexu pilosus.

4. *M. pinguis* nigra nitida tarsis nigris.
Mas & Fem. In gramine pratorum Prædii Beckastog Scaniae rarior obvia, mense Julio. — Corpus paullo crassius magisque obtusum quam in præcedentibus, nigrum: vertice distincto setoso, nitido. Seta antennarum longa. Pedes toti nigri. Ala hyalinæ. nervo longitudinali quanto quintoque valde distantibus, nervuloque transv. ordin. altius in disco alæ situs, quam in *M. glabra*.

5. *M. sordida* nigra opaca, thorace fusciscente.
Mas & Fem. In gramine Esperöd minus frequens. — Præcedenti similis, at diversa & corpore opaco, magis cinerascente & situ nervorum transversorum in alis magis distante. Antennæ & pedes nigra.

Not. Species 4, 5 ab *Agromyzis* parum discrepant, nisi capite magis producto.

GYMNOPA *Clypeus* descendens, retusus, apice tuberculatus. *Antennæ* deflexæ, medio frontis insertæ. *Corpus* glabrum: vertice brevi, inermi.

1. *G. ænea* nigro-ænea, tarsis albicantibus.
Mas & Fem. In parietibus, & in floribus mense Septembri passim obvia, at mense Aprili in copula observata. — *Oscine* lineata brevior, at latior & robustior. Corpus obtuse ovatum, glabrum, ænescens, duriusculum, gibbesum: abdomine inflexo, planiusculo, glaberrimo. *Clypeus* perpendiculatis inæqualis, infra antennâs impressus, ad apicem tuberculo distincto, similiter atque in ERSTALE, armatus. *Antennæ* brevès, nigra: seta nuda, brevi. *Oculi* rotundi, mediocres, late distantes. Caput autem transversum vertice brevi & convexo gaudet, setis omnino destitutum. *Pedes* simplices, validi, setulis femorum parum perspicuis armati, nigri: tarsis albicantibus. *Ala* hyalinæ: nervo auxiliari mediocri, nervo tertio longitudinali recto, quarto versus nervulum transv. ordin. flexo, paullo pòne apicem alæ cum nervo costali conjuncto. Nervulus transv. medius apici nervi auxiliariis opponitur, a nervulo ordinario, propius ad marginem alæ interiorè ducto, sat longe distans.

Not. A nuditate corporis, præsertim frontis, nomen Generis desumimus. Ob defectum setarum verticis Oscinidibus hanc inseruimus speciem. *Metamorphosis* autem ignota; non forsitan hujus Familiæ?