

## Spanische Dipteren II

376

G. STROBL

(106)

var. *talaria* Rond. (nur durch die dunklere Färbung der Hintertarsen von der Normalform verschieden; da aber auch bei diesser bald 2, bald 3 Tarsenglieder rotgelb sind, so ist das Merkmal, dass nur 1 Tarsenglied rotgelb ist, von keinem spezifischen Wert). Bei *Elche* 1 ♀. Ich besitze diese Varietäten auch aus Dalmatien etc.

(311). *Desmometopa M-nigrum* Ztt. Um *Almeria*, *Alicante*, *Elche*, *San Celoni*, *Portbou* ♂ ♀ häufig. 2. März -

875. *Desm. M-atrum* Mg., Schin. 304. Bei *San Celoni* 1 ♂.

876. *Desm. latipes* Mg. Um *Monistrol* und *Malgrat* 2 ♀ mit ganz rotgelber Vorderstirn und Untergesichte.

(314). *Agromyza lacteipennis* Fall., Schin., Str. Bosn. Auf Grasplätzen bei *Almeria*, *Ronda* 2 ♂, 1 ♀. 9. März - 4. April

(315). *Agr. vagans* Fall., Schin., Str. l. cit. Auf Grasplätzen um *Almeria* ♂ ♀ häufig. 11+12. März

var. *obscurella* Fall. Um *Almeria* und *Alicante* 6 ♂, 2 ♀. 2-12. März

(317). *Agr. scutellata* Fall. Diese winzige Art varriert (auch in Spanien) ganz ausserordentlich und die Varietäten wurden von Mg. und Rond. als eigene Arten beschrieben. Alle stimmen überein: Kopf, Fühler, Brustseiten, Schildchenmitte gelb; Thoraxrücken glänzendschwarz, nicht oder kaum bereift; Queradern sehr genähert; die hintere steht kaum jenseits der Mündung der 1. Längsader; der letzte Abschnitt der 4. Längsader daher bis achtmal, der der 5. Längsader bis dreimal länger, als der vorletzte; die 2.-4. Längsader laufen fast parallel und die 4. mündet in die Flügelspitze. Die Variationen beziehen sich fast ausschliesslich auf die Färbung des Hinterleibes, der Fühler, Beine und sind nicht local gesondert.

a. Normalform = *pusilla* Mg., *pusio* Mg., Rond. Soc. ent. It. 1875. Fühler und Schenkel gelb, Hinterleibsseiten nicht rotgelb. Um *Malgrat* und *Almeria* 2 ♂ (auf der 1. Reise 4 ♂). Stimmt mit centraleur. Ex., nur ist die Schenkelbasis etwas braun oder die Schenkel sind etwas braungestreift und die Brustseiten etwas ausgedehnter dunkel gefleckt; die Schienen und Tarsen sind stets, wie schon Schiner hervorhebt, bedeutend dunkler als die Schenkel, aber nicht schwarz.

b. var. *pascuorum* Mg., *lacertella* Rond. l. cit. Ganz wie a,