

N. B. 37



1) Erster Nachtrag zu dem im Jahre 1834 veröffentlichten Verzeichnisse in Württemberg vorkommender zweiflügliger Insekten.

Von Geh. Legationsrath v. Moser.
Aus dem Correspondenzblatt des k. württ. landw. Vereins Jahrgang 1840. Bd. 1. S. 1. besonders abgedruckt.

Bei der im Jahr 1834 unternommenen Bekanntmachung eines Verzeichnisses der in Württemberg vorkommenden zweiflügligen Insekten im Correspondenzblatt (1834. Bd. 1. S. 259 fg.) machte ich darauf aufmerksam, wie sehr dasselbe noch der Bervollständigung bedürfte und verband damit den Wunsch, daß diejenigen unserer Landesleute, welche sich für diesen Theil der Naturwissenschaften interessiren, zu dessen Ergänzung mitwirken möchten.

Dieses Ersuchen ist zwar bisher ohne Erfolg geblieben, indem mir (mit alleiniger Ausnahme einiger von Hrn. Prof. Vering aus Larven erzogener Destraciden) von keiner Seite eine Mittheilung einheimischer Dipteren zukam. Da ich indeß seither selbst eine beträchtliche Anzahl weiterer Dipteren in Württemberg aufgefunden habe, und da, ob ich gleich zu meinem Bedauern die englischen Werke über diese Insektenordnung nicht benützen konnte, doch durch die Macquart'schen Suites à Buffon und durch das Erscheinen der im VII. Bande des berühmten Meigen'schen Werks enthaltenen Zusammenstellung zahlreiche weitere Beschreibungen neuer entbehrter Arten vorliegen, so wollte ich nicht länger anstehen, einen ersten Nachtrag zu dem obgedachten Verzeichnisse auszufertigen, welchen ich dem Vereine hiemit vorzulegen mich beehre.

Wenn gleich durch seither aufgestellte weitere Abtheilungen der frühern Gattungen einige Aenderung in der Nomenclatur eingetreten ist, so glaube ich doch, da dieser Nachtrag als Fortsetzung an das erste Verzeichniß sich anschließen muß, die dort beobachtete Reihenfolge und die dort aufgeführten Gattungsnamen unverändert beibehalten zu müssen, indem ich übrigens die neuern Benennungen nach Meigen in Parenthesen beifüge (namentlich bei Syrphus, Tachina, Musca, Dexia, Anthomyia u. s. w.).

Eine Anzahl meines Wissens noch nicht beschriebener Arten habe ich unter den Namen, mit welchen ich sie zum Theil meinen Bekannten mittheilte, mit aufgenommen, jedoch durch kurze Bezeichnung der Merkmale, wodurch sie sich von verwandten Arten unterscheiden, dem Mangel einer ausführlicheren Beschreibung, wozu hier der Ort nicht war, abzuheffen gesucht.

Auch durch diesen Nachtrag ist übrigens das vom Verein beabsichtigte Verzeichniß der württembergischen Dipteren noch lange nicht vollständig, namentlich werden die Gattungen Chironomus, Ceratopogon, Syrphus, Tachina, Anthomyia, Chlorops etc. noch zahlreiche Zusätze liefern. Ich erlaube mir daher, den im Eingange erwähnten Wunsch, insbesondere auch in Beziehung auf zufällig vorkommende Larven von Dipteren, deren noch so sehr viele ganz unbekannt sind, angelegentlich zu wiederholen, damit ich in den Stand gesetzt werden möge, bald einen zweiten Nachtrag vorzulegen.

Stuttgart, im Januar 1840.



Roser.

I. Familie: Tipulariae, Mücken.

a) Culiciformes.

Culex,

lateralis, *Mgl.*

Chironomus,

nigro-viridis, *Macquart.*

viridulus, *L.*

dispar, *Mg.*

obscurimanus, *Mg.*

pulchellus, *Mg.*

marginatus, *Mg.*

dizonias, *Mg.*

Tanypus,

fusco-femoratus, m. (fuscus, abdominis incisuris pallidis; alis cinereo-nebulosis; femoribus fuscis, annulo albo; tibiis tarsisque albo nigroque varis.)

Ceratopogon,

leucopeza, *Mg.*

annulipes, *Mg.*

armipes, *Mg.*

apicalis, m. (alis apice fuscis.)

fuscus, *Mg.*

Macropeza,

albitarsis; *Mg.*

b) Gallicolae.

Lasioptera,

argyrosticta, *Mg.*

Cecidomyia,

cucullata, *Mg.*

albitarsis, *Mg.*

maxima, *Schr.*

maxima, m. (nigrofusca, halteribus carnelis.)

varipes, m. (alis immaculatis; pedibus pallidis, geniculis fuscis.)

aurantiaca, *Macq.*

marginata, m. (marginibus alarum omnibus nigris.)

atra, m. (tota nigra, alis nigricantibus.)

Campylomyza,

bicolor, *Wdm.*

atra, *Mg.*

c) Noctuaeformes.

Psychodae

calceata, *Mg.*

canescens, *Mg.*

marginepunctata, m. (margine apicali alarum punctis 9 fuscis.)

flavescens, m. (capite, thorace, abdomine alisque pilis flavescens.)

d) Rostratae.

Limnobia,

pilipes, *F.*

mitis, *Mg.*

vitripennis, *Mg.*

limbata, m. (leucocephalae similis, abdominis lateribus et apice flavis.)

cothurnata, *Macq.*

stigmosa, *Mg.*

marginepunctata, m. (E. margine alarum toto nictato, nervis transversalibus; pedibus pallidis, geniculis fuscis; antennis fuscis.)

fuscofemorata, m. (E. aerynnae similis; alis, stigmatibus immaculatis, femoribus basi pallida.)

alboscuteolata, m. (R. fuscicollis, sutura collari et basi albis.)

Ctenophora,

elegans, *Mg.*

festiva, *Mg.*

Tipula,

obsoleta, *Mg.*

clandestina, *Mgl.*

pabulina, *Mg.*

cervina, *Mgl.*

lineola, *Mg.*

fasciipennis, *Hmg.*

pruinosa, *Hmg.*

annulicornis, *Mg.*

dentata, *Mg.*

Trichocera,

annulata, *Mgl.*

e) Fungicolae.

Dixa,

nebulosa, *Mg.*

Boletophila,

bimaculata, m. (alis fusciculis.)

Macrocera,

fusciiventris, m. (thorace abdomine fusco, incisuris; alis vitreis.)

Platyura,

femorialis, *Mg.*

bifasciata, m. (ochracea,

fuscofasciata; alis bifasciatis.)

fuscescens, m. (fusca, sutura collari, abdominis incisuris.)

- Ephydra*,
rufitarsis, *Macq.*
noctula, *Mg.*
glauca, *Mg.*
pictipennis, *Mg.*
interstincta, *Fall.*
pallipes, *Mg.* (var.? tibiis posticis annulo pallido.)
posticata, *Mg.*
guttata, *Fall.*
rufipes, *Mg.*
- Leucopis*,
griseola, *Mg.*
puncticornis, *Mg.*
lusoria, *Mg.*
albipennis, *Mg.*
impunctata, m. (abdomine non punctato; var.?)
- Gymnopa*,
glabra, *Mg.*
- Chlorops*,
gracilis, *Mg.*
cinctipes, *Mg.*
albitarsis, *Mg.*
lateralis, *Macq.*
quadrimaculata, m. (flava, thorace nigrovittato, abdomine nigrofasciato, segmento 1. et 4. punctis 2. nigris.)
distincta, m. (albisetae similis, tarsi posterioribus rufis.)
palposa, *Fall.*
aprica, *Mg.*
maura, *Fall.*
coxalis, m. (nigra, coxis flavis.)
vindicata, *Mg.*
nitida, *Mg.*
nigricornis, m. (nitidae similis, antennis tarsisque anticis nigris.)
atra, *Mg.*
basalis, m. (nitidae similis, scutello punctatissimo; abdomine basi fascia fulva.)
flavitaris, *Mg.*
fulviceps, m. (nigra nitida, capite pedibusque fulvis; alis hyalinis.)
cincta, *Mg.*

- cingulata*, m. (capite fulvo, thorace cinereo, pallide vittato; abdomine fusco, incisuris albis; pedibus pallidis, femoribus supra fuscis.)
scutellata, m. (capite fulvo, piloso; thorace cinereo, lateribus flavescente; scutello fulvo; abdomine fusco, basi alhomaculato; pedibus pallidis, femoribus linea fusca.)
apicalis, m. (cinerea, fronte et scutelli apice flavis.)
nigrita, *Mg.*
viridescens, *Macq.*
nigrimana, m. (nigra, tarsi rufescentibus, anticis nigris.)
viridis, m. (viridi-aenea, pedibus rufis.)
aenea, m. (capite thoraceque nigris; abdomine aeneo; tarsi rufis.)
- Crassiseta*, (*Chlorops*, *Mg.*)
cornuta, *Mg.*
femoralis, *Mg.*
flaviventris, m. (cornutae similis, abdomine basi et subtus flavo; thorace vittis 3. cinereis.)
annulipes, m. (cornutae similis, femoribus tibiisque posticis annulo fusco.)
fuscipes, m. (cornutae similis, capite nigro, pedibus fuscis, geniculis tarsisque rufescentibus.)
- Meromyza*,
laeta, *Mg.*
nigriventris, *Macq.*
femorata, *Macq.*
rufescens, m. (pallida, thoracis vittis et abdominis dorso rufis, puncto verticis, duobus primi segmenti et metathorace nigris.)
virescens, m. (pallida, thoracis vittis confluentibus, linea scutelli et femorum posticorum, abdominisque dorso fusco-virescentibus.)
- basalis*, m. (abdomine basi pallido; antennis supra et femoribus omnibus linea fusca.)
- Agromyza*,
aenea, *Mg.*
Matrum, *Mg.*
securicornis, *Mg.*
nigritarsis, *Mg.*
ornata, *Mg.*
flavogeniculata, m. (nigra, fronte antice, femoribus basi apiceque flavis.)
hyalipennis, *Mg.*
latipes, *Mg.*
annulitarsis, m. (praecedenti similis, tibiis non dilatatis, tarsi flavo annulatis.)
annulimana, m. (praecedenti similis, tibiis anticis annulis 3. flavis.)
scutellaris, m. (atra, scutello subtus albomarginato.)
gyrans, *Fall.*
pygmaea, *Mg.*
lactipennis, *Mg.*
minuta, *Mg.*
flavifrons, *Mg.*
pumila, *Mg.*
exilis, *Mg.*
pusio, *Mg.*
humeralis, m. (nigra, humeris albis.)
- Phytomyza*,
nigricans, *Macq.*
festiva, *Mg.*
nigra, *Mg.*
atra, *Mg.*
flavicornis, *Fall.*
nigricornis, *Macq.*
femoralis, m. (fusca, capite tibiis tarsisque flavis, pleuris albidis.)
pallida, *Mg.*
citrina, m. (tota pallide flava, antennarum articulo ultimo nigro.)
rufescens, m. (rufescens, thorace supra cinereo, metathorace et abdominis apice nigris.)
geniculata, *Macq.*
stylata, *Macq.*