

NIEUWE NAAMLIJST

VAN

NEDERLANDSCHE DIPTERA

DOOR

F. M. VAN DER WULP

EN

Dr. J. C. H. DE MEIJERE

Uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging
als Bijvoegsel tot deel XLI
van het Tijdschrift voor Entomologie.

'S GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF

1898

20 571

- L. acutangula* Sten. — Scand. VI. 2499; Schin. Fn. austr. II. 328. — Walcheren; in het Overmaassche, 4, Piag.
L. litoralis Sten. — Fn. austr. II. 331. — Middelburg, 9, de Man; den Helde. — Arnhem, 4, v. Voll.
L. coxata Sten. — Fn. austr. II. 332. — Oosterwijk, 7, de M.; Diemen, 7 en Bussum.
L. pullula Zett. Dipt. Scand. VI. 2552. — Middelburg, 9, v. Voll.; Schin. Fn. austr. II. 332. — Walcheren, G. v. W.; Haarlem.
L. zosteræ Hal. Ent. Mag. — Scand. VI. 2552. — Middelburg, 9, v. Voll.; Schin. Fn. austr. II. 332. — Haarlem.
L. setulosa Zett. Dipt. Scand. VI. 2552. — Middelburg, 9, v. Voll.; Schin. Fn. austr. II. 332. — Haarlem.

OCHTHIPHILINAE.

Ochthiphila.

- O. maritima* Zett. — B. 1301. — 's Gravenhage, 7, v. d. W. en 8, de M.; Wassenaarsche duinen, 6, 8, v. Voll.; Loosduinen, 7, de M.; Texel, 5, Rits.
O. polystigma Meig. — B. 1302. — 's Gravenhage, 6—8, enkele exempl., v. d. W.; Diemen, 6, IJmuiden, 6—8 en Kortenhoeft, 5, de M.; Utrecht, 5, Six.
O. junctorum Fall. — B. 1303. — Niet zeldzaam op zandgrond.
O. aridella Fall. — B. 1304. — Als de vorige, doch minder algemeen.
O. cornuta Löw, Wien. Ent. Mon. schr. II. 221; Schin. Fn. austr. II. 292. — 's Gravenhage en Scheveningen, 5, 6, Piag.
O. elegans Panz. — Schin. Fn. austr. II. 292. — Zuid-Limburg, Versal.

Leucopis Meig.

- L. griseola* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 294. — Haarlem, 5, Weyenb.; Utrecht, Six.
L. nigricornis Egg. — Schin. Fn. austr. II. 295. — 's Gravenhage, een ♀, Six.

Cacoxenus Löw.

- C. indagator* Löw, Wien. Ent. Mon. schr. II. 218; Schin. Fn. austr. II. 299. — Leiden, 5, Rits.; Bodegraven, 5, de M.

Phyllomyza Fall.

- Ph. flavitarsis* Meig. — B. 1321. — Leiden, 8, v. Voll.
Ph. securicornis Fall. — Schin. Fn. austr. II. 312. — Valkenburg, 7, Piag.; uit een nest van *Formica rufa*, Exaeten, Wasm.; Diemen, 6, 8, de M.; Maarsbergen, 7, Piag.

AGROMYZINAE.

Agromyza Fall.

- A. lacteipennis* Fall. — B. 1305. — 's Gravenhage, 5, 7, v. d. W.; Haarlem, 5, Weyenb.; Amsterdam, 9, Sw.; Driebergen, 6, Six.

- A. vagans* Fall. — B. 1306. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Driebergen, Six.
A. lutea Meig. — B. 1307. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Voorst en Empe, 8, v. Eyndh.; aan den zeedijk te Kampen, v. Voll.
A. pusilla Meig. — B. 1308. — Bergen-op-Zoom, 5, Piag.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, Piag.; Bloemendaal en Hilversum, 7, v. d. W.; Amsterdam, 5, Kink.; Diemen, 6, 7, de M.; Schoorl, 5, Jasp.; Utrecht, Six.
A. flaveola Fall. — B. 1309. — Middelburg, 5, 9, de Man; 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; in het Overmaassche 5, Piag.; Haarlem, 10, Kink.; Utrecht, 5, Six.
A. strigata Meig. — B. 1310. — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Voorburg, 9, Iv. Schepm.
A. exigua Meig. — B. 1311. — Voorburg, 9, Iv. Schepm.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.
A. reptans Fall. — B. 1312. — Maastricht, 5, 8, 9, Maur.; Valkenburg, 6, Oudem.; 's Gravenhage, 5—10, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Amsterdam, 5, 7, 8, Kink.; Bussum, 4, 6, de M.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Kuilenburg, 6, de M.
A. nigripes Meig. — B. 1313. — Middelburg en Domburg, 7, 8, 9, de Man; 's Gravenhage en Wassenaar, 5—9, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, 6, Weyenb.; Amsterdam, 5, Kink.; Diemen, 7, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Maarsbergen, 8, Piag.; Brummen, 10, v. Voll.; Wageningen, 7, v. d. W.
A. errans Meig. — B. 1314. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; Empe, v. Eyndh.
A. albohyalinata Zett. — B. 1315. — Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 9, een ♀, v. d. W.
A. curvipalpis Zett. — B. 1316. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 8, Piag.
A. gyrans Fall. — B. 1317. — 's Gravenhage, 8, Six en v. d. W.
A. maura Meig. — B. 1318. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Hilversum, 7, v. d. W.; Haarlem, 5, Weyenb.; Vogelenzang, 7, Piag.; Utrecht, Six; Beek, 7, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.
A. bimaculata Meig. — B. 1323 (*Phyllomyza*). — 's Gravenhage, 5 en 8, v. d. W.; Driebergen, 6, Six.
A. obscurella Fall. — Schin. Fn. austr. II. 300. — Rotterdam, 10, Piag.; Bodegraven, 8, 9 en Enkhuizen, 9, de M.; Amsterdam, 8, Sn.; Utrecht, 5, uit larven, mineerend in *Lonicera xylosteum*, Six.
A. capitata Zett. Dipt. Scand. VII. 2750; Schin. Fn. austr. II. 302. — Nuth, 7, Maur.; Liesbosch bij Breda, 5, Piag.; Koudekerke, duinen, 6, de Man.

- A. geniculata* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 302. — Middelburg, 6, de Man.
- A. carbonaria* Zett. Dipt. Scand. VII. 2739; Schin. Fn. austr. II. 303. — Maastricht, 6, Maur.; Middelburg, 7, 8, de Man; in N. en Z. Holland op verschillende plaatsen; Amersfoort, 6, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- A. cunctans* Meig. Syst. Besch. VI. 178; Schin. Fn. austr. II. 304. — West-Capelle, 6 en Rotterdam, 6, 8, Piag.; Haarlem, 6, Weyenb.
- A. amoena* Meig. Syst. Besch. VI. 187; Schin. Fn. austr. II. 306. — Amsterdam, 7, uit larven, mineerend in bladeren van *Sambucus nigra*, de M.
- A. albitarsis* Meig. Syst. Besch. VI. 171. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- A. flava* Meig. Syst. Besch. VI. 177. — Diemen, 6, gekweekt uit bladeren van *Symphytum officinale*, de M.
- A. ruficornis* Macq. Suit. à Buff. II. 608. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Haarlem, 7, Rits.
- A. xanthocephala* Zett. Dipt. Scand. XIV. 6547. — Bloemendaal, 9, uit larven, mineerend in bladeren van *Saponaria officinalis*, de M.
- A. flavoscutellaris* Zett. Dipt. Scand. VII. 2769. — 's Gravenhage, Six.
- A. ferruginosa* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 205. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.
- A. riparia* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 205. — Plasmolen, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Schielandsche plassen, 8, Piag.; Amsterdam, 5, Kink.; Utrecht, Six.
- A. discrepans* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 206. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.

Desmometopa Löw.

- D. latipes* Meig. — B. 1819, het ♂ (*Agromyza latipes*); B. 1192, het ♀ (*Madiza annulitarsis*). — Nuth, 7, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.
- D. sordida* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 305 (*Agromyza*); v. d. W., Tijdschr. v. Ent. XIV. 197 (*Madiza*). — Domburg, 7, de Man; Haarlem, 5, Weyenb.

Ceratomyza Schin.

- C. acuticornis* Meig. — B. 1820. — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage en Scheveningen, 6—8, v. d. W.; Rotterdamseche plassen, 6, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 8, Kink.; Diemen, 6, 7, Bussum, 9 en Hilversum, 6, de M.; Utrecht, Amersfoort, 6 en Driebergen, 10, Six; Lochem, 6, de M.
- C. spinicornis* Macq. — B. 1821. — Middelburg, 8, de Man;

's Gravenhage, 6—9, v. d. W.; Rotterdam en in het Overmaasche, 6, Piag.; Amsterdam, 6, Jasp.; Vreeland, 5, Kink.; Utrecht, Amersfoort en Driebergen, 5, 6, 10, Six.

Napomyza Hal.

- N. elegans* Fall. — B. 1824 (*Phytomyza*). — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Rotterdam, 6, Piag.; Hilversum, 6 en Kortenhoef, 5, de M.; Utrecht, 7, Six.
- N. lateralis* Fall. — B. 1825 (*Phytomyza*). — Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5 en 9, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Haarlem, 5, 7, Weyenb.; Amsterdam, 9, Jasp.; id. 8, gekweekt uit bloemhoofdjes van *Chrysanthemum inodorum*, de M.; Alkmaar, 10, Jasp.; Overveen, 5 en Naarden, 7, de M.
- N. annulipes* Meig. — B. 1826 (*Phytomyza*). — Voorst, 4, Wtt.
- N. harlemensis* Weyenb. Tijdschr. v. Ent. XIII. 196 (*Phytomyza*). — In het Overmaasche, 6, Piag.; Haarlem 7, gekweekt uit *Symphoricarpy racemosa*, Weyenb.
- N. picipes* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 207 (*Phytomyza*). — 's Gravenhage, 4, v. d. W.
- N. nigriceps* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 207 (*Phytomyza*). — 's Gravenhage, 5, v. d. W.

Phytomyza Fall.

- Ph. flava* Fall. — B. 1827. — Middelburg, 8, 9, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Wassenaar, 6, v. Voll.; Rotterdam en in het Overmaasche, 6, 7, Piag.; Amsterdam, 9, Jasp.; Diemen, 7, de M.; Amersfoort en Utrecht, 5, 6, Six.
- Ph. nigripennis* Fall. — B. 1828. — Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- Ph. obscurella* Fall. — B. 1829. — Herhaaldelijk en in de meeste provinciën aangetroffen. Gekweekt uit larven, mineerend in Hulstbladeren, Zutphen, v. Eyndh.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam, Mail.
- Ph. flavicornis* Fall. — B. 1830. — Rookanje, 5, Piag.; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Zwammerdam, 2, de M.; Haarlem, 4, 8, Weyenb.; Diemen, 7, de M.; Utrecht, 5, Six.
- Ph. flavoscutellata* Fall. — B. 1831. — Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam en in het Overmaasche, 4, 5, Piag.; Bodegraven, 5, 8, de M.; Bloemendaal, 8, de M.; Bussum, 5, Jasp.; Amsterdam, 5, Kink.
- Ph. geniculata* Macq. — B. 1832. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 5 en Rookanje, 6, Piag.; Vreeland, 5, Kink.; Driebergen, 10, Six; Empe, 6, v. Eyndh.
- Ph. albipennis* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 315. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 4, 7, v. d. W.; Utrecht, Six.